



Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління



Цефинак

Склад: 1 таблетка містить цефіксиму 200 мг (№ 10) або 400 мг (№ 10)

Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів.

Застосування: 200-400 мг на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені цистити – 3 дні.

Р.П. №: UA/16758/01/01, UA/16758/01/02

Виробник: Нектар Лайфсайнсз Лтд., Індія

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління



Цефинак

Склад: 5 мл суспензії містить цефіксиму 100 мг (флакони 50 мл або 100 мл)

Показання: Інфекції верхніх дихальних шляхів у т.ч. запалення середнього вуха, у разі відомої або підозрюваної стійкості збудника до інших часто використовуваних антибіотиків або в разі ризику неефективності їх застосування; інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів.

Застосування: Дітям віком від 6 місяців: 8 мг/кг маси тіла на добу одноразово або у вигляді двох окремих доз – від 7 до 14 днів. Неускладнені цистити – 3 дні.

Р.П. №: UA/16758/02/01

Виробник: Нектар Лайфсайнсз Лтд., Індія



Антибактеріальні засоби для системного застосування



Абиклав®

Склад: 1 таблетка містить амоксициліну 500 мг та клавуланової кислоти 125 мг (№20) або амоксициліну 875 мг та клавуланової кислоти 125 мг (№10)

Показання: Інфекції ЛОР-органів, бронхів та легень, інфекції шкіри та м'яких тканин, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції кісток та суглобів.

Застосування: Дорослі та діти від 6 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 500 мг/125 мг 3 рази на добу. Дорослі та діти від 12 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка 875 мг/125 мг 2 рази на добу.

Р.П. №: UA/11903/01/01, UA/11903/01/02

Виробник: Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

Антибактеріальні засоби групи хінолонів. Фторхінолони



Абифлокс®

Склад: 1 таблетка містить левофлоксацину 500 мг (№10)

Показання: Гострі синусити, загострення хронічних бронхітів, негоспітальна пневмонія, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів у т.ч. пієлонефрити, інфекції шкіри та м'яких тканин, хронічний бактеріальний простатит.

Застосування: Дорослі від 18 років: 250-1000 мг 1-2 рази на добу. Тривалість лікування від 7 діб. Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів – 3 доби.

Р.П. №: UA/14416/01/02

Виробник: Ауробіндо Фарма Лтд., Індія



Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління



Цедоксим®

Склад: 1 таблетка містить цефподоксиму 100 мг (№10) або 200 мг (№10)

Показання: Інфекції ЛОР-органів, негоспітальна пневмонія, загострення хронічного інфекційного бронхіту, неускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, гостра неускладнена цервікальна та уретральна гонорея.

Застосування: 100-200 мг 2 рази на добу від 5 до 14 днів, гостра неускладнена гонорея 200 мг одноразово 1 день.

Р.П. №: UA/14455/01/01, UA/14455/01/02

Виробник: Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління



Цедоксим®

Склад: 5 мл суспензії містять цефподоксиму 40 мг (флакони 100 мл)

Показання: Інфекції ЛОР-органів (гострий середній отит, синусит, тонзиліт, фарингіт), інфекції дихальних шляхів (пневмонія, гострий бронхіт, бронхіоліт, ускладнений бактеріальною суперінфекцією), неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (гострий пієлонефрит і цистит), інфекції шкіри та м'яких тканин.

Застосування: 8 мг/кг маси тіла на добу у 2 прийоми з інтервалом 12 годин. Дітям з масою тіла до 20 кг одного флакона вистачає на 5 днів.

УВАГА!! Зручна мірна ложка = КГ.

Р.П. №: UA/14455/02/01

Виробник: Ауробіндо Фарма Лтд., Індія



Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины III покоління

Емсеф® 1000

Склад: 1 флакон містить цефтриаксону 1000 мг

Показання: Профілактика інфекцій, ЛОР-інфекції, інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'яких тканин, інтраабдомінальні інфекції, гінекологічні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менінгіт, бореліоз Лайма, ЗПСШ.

Застосування: Для в/в та в/м введення. Добова доза: дорослі і діти від 12 років – 1-4 г, діти від 15 днів до 12 років – 20-80 мг/кг маси тіла, новонароджені до 2 тижнів – 20-50 мг/кг маси тіла.

Р.П. №: UA/9914/01/01
Виробник: Нектар Лайфсайдс Лтд., Індія



Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорины IV покоління

Абипим®

Склад: 1 флакон містить цефепіму 1000 мг

Показання: Інфекції нижніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м'яких тканин, інтраабдомінальні інфекції, гінекологічні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менінгіт.

Застосування: Для в/в та в/м введення. Дорослі: 0,5-2 г, діти від 2 місяців з масою тіла до 40 кг: 50 мг/кг маси тіла, діти від 1 до 2 місяців: 30 мг/кг маси тіла – 2-3 рази на добу протягом 7-10 днів і більше.

Р.П. №: UA/10084/01/02
Виробник: Нектар Лайфсайдс Лтд., Індія



Інгібітори протонного насоса

Оменакс®

Склад: 1 флакон містить омепразолу 40 мг

Показання: Лікування виразки дванадцятипалої кишки, виразки шлунка, ерадикації *H. pylori*, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки пов'язаної із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), рефлюкс-езофагіту, симптоматичної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, синдрому Золлінгера-Еллісона.

Застосування: Для в/в ін'єкції або інфузії. 40 мг 1 раз на добу, синдром Золлінгера-Еллісона – 60 мг і більше до 2 разів на добу.

Р.П. №: UA/15268/01/01
Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція



Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

Диклодев®

Склад: 1 ампула 3 мл містить диклофенаку натрію 75 мг (№5)

Показання: Лікування запальних та дегенеративних форм ревматизму, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту, остеоартриту, спондилоартриту, вертебрального больового синдрому, несуглобового ревматизму, гострих нападів подагри, ниркової та біліарної колік, болю та набряку після травм і операцій, тяжких нападів мігрені, післяопераційного болю.

Застосування: Для в/в та в/м введення. Дорослим: 1 ампула 1-2 рази на добу. Препарат застосовують не більше 2 днів.

Р.П. №: UA/15297/01/01
Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція



Протимікробні засоби для системного застосування. Карбапенеми

Демопенем®

Склад: 1 флакон містить меропенему 1000 мг

Показання: Лікування бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі, ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, пневмонії, ускладнених інтраабдомінальних інфекцій, інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій, ускладнених інфекцій шкіри і м'яких тканин, гострого бактеріального менінгіту, фебрильна нейтропенія.

Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі та діти з масою тіла ≥ 50 кг: 500 мг до 2 г, діти від 3 місяців до 11 років: 10 мг/кг до 40 мг/кг 3 рази на добу.

Р.П. №: UA/14759/01/01
Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція



Антибактеріальні засоби групи хінолонів. Фторхінолони

Абифлокс®

Склад: 1 флакон (100 мл) містить левофлоксацину 500 мг

Показання: Бактеріальні запальні процеси у дорослих, спричинені бактеріями, чутливими до левофлоксацину: запалення легенів, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекції шкіри та м'яких тканин, хронічний бактеріальний простатит.

Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі від 18 років: 250-500 мг 1-2 рази на добу.

Р.П. №: UA/14416/02/01
Виробник: ДЕМО С.А. Фармасьютикал Індастрі, Греція

